




GATA Askeri Tıp Fakültesi

# SEMPATİK SINİR BLOKLARI

DR. ERCAN KURT



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı



# Sempatik bloklar

## ❖ Sempatik sinir sistemi

- Visseral ağrılarında
- Vasküler ağrılarında

## ❖ Sempatik sinir blokları

- Tanı için
- Tedavi için
  - Lokal anestezik, alkol, fenol, RF

## ❖ Nerede bloke edebiliriz?

- Subaraknoid boşluk
- Epidural boşluk
- Paravertebral bölge
- Periferik sinirler
- Postganglionik aksonlar

# Sempatik sinir blokları

## ❖ Endikasyonlar

### 1. Periferik vasküler hastalıklar

- ✓ Akut arter tıkanığı, IV ilaç enjeksiyonu
- ✓ Kr vazospastik bozukluklar; Raynaud hastalığı, akrosiyanoz
- ✓ Kr arter hastalığı; Tromboanjitis obliterans (Buerger), arteriosklerozis obliterans

### 2. Visseral ağrı

- ✓ Torasik visseral ağrı ; Akut MI, angina pectoris, aort anevrizması
- ✓ Abdominal visseral ağrı: Akut ve kr pankreatit, safra ve ureter kolisi
- ✓ Kanser ağrısı: Pankreas, mide, Kc. ,transvers kolon

### 3. Kompleks rejyonal ağrı sendromu (CPRS)

- ✓ CPRS Tip I : Refleks sempatik distrofi
- ✓ CPRS Tip II : Kozağı
- ✓ CPRS Tip III : Sempatik kökenli ağrı

# Sempatik sinir blokları

## 4. Postamputasyon ağrı sendromları

- ✓ Fantom ve stump(güdük) ağacı

## 5. Akut herpes zoster ve postherpetik nevralji

## 6. Hiperhidrozis


## 7. Diğer ağrılı nörolojik bozukluklar

- ✓ Hiperestezi, allodini ve soğuğa hassasiyet, santral ağrı

# Sempatik sinir blokları

## ♦ Sempatik sinir sistemi

- Derin fasyal boşluklarda olması
- Vital yapılara yakın komşuluğu
- Yüksek volümde nörolitik uygulanması
- Nörolitik yerine RF tercih edilmeli




Görüntüleme yöntemleri altında  
yapılmalıdır. Florası, BT, US

# **Blokaj uygulama prosedürü**

- Hastanın aydınlatılmış rızası alınır
- Hasta monitörize edilir
- Blokajda en iyi bilinen ve en uygun yöntem seçilir
- Doğru ilaç; uygun volüm ve konsantrasyonda kullanılır

# Sempatik sinir blokları



**Sfenopalatin ganglion**

**Stellat, Servikotorasik ganglion**

**Splanknik sinirler**

**Cöliak pleksus**

**Lomber ganglion**

**Hipogastrik pleksus**

**İmpar ganglion**

# SFENOPALATIN GANGLION BLOĞU (MECKEL GANGLION BLOKAJı)

## Endikasyonları


- Akut küme başağrısı
- Akut migren
- Fasyal nevralji

## Teknik

- %10 Lidokainli pamuk
- RF

## Komplikasyon

- Epistaksis



# SERVIKOTORASIK GANGLION BLOĞU


## (STELLAT GANGLION BLOĞU)

Üst servikal ganglion C<sub>2-3</sub>

Orta servikal ganglion C<sub>5-6</sub>

Alt servikal ganglion C<sub>7-8</sub> ve T<sub>1</sub>

Chassaignac  
tüberkülü



# **Stellat ganglion bloğu**

## **Endikasyonlar - 1**


- ❖ Raynaud hastalığı
- ❖ Kolda arteriyel embolism
- ❖ İtra-arteryel ilaç injeksiyonu
- ❖ Meniere sendromu
- ❖ Hiperhidrozis
- ❖ Akut herpes zoster (yüz ve üst torakal segment)
- ❖ Post herpetik nevralji
- ❖ CRPS Tip I
- ❖ CRPS Tip II

# **Stellat ganglion bloğu**

## **Endikasyonlar - 2**

- ❖ Fasiyal refleks sempatik distrofi
- ❖ Üst ekstremitede posttravmatik refleks sempatik distrofi
- ❖ Damar cerrahisinde diagnostik, prognostik ve profilaktik

# **Servikotorasik ganglion Bloğu (Stellat Ganglion Bloğu)**



## **Pozisyon**

**Sırtüstü  
Boyun altına yastık**

Anterior teknik  
Posterior teknik  
Lateral teknik

**Bilateral önerilmiyor**

**N.Frenikus bloğu  
N.Rekurrens bloğu**


# SERVIKOTORASIK GANGLION BLOĞU (STELLAT GANGLION BLOĞU)

## Anterior teknik

- ❖ Chassaignac tüberkülünün palpasyonu (C<sub>6</sub>)
- ❖ İğne ile kemiğe temas
- ❖ Aspirasyon testi
- ❖ Test doz

## Başarılı blok kriteri


- ❖ Horner sendromu
  - Enoftalmi
  - Miyozis
  - Ptozis
- ❖ El ve ön kolda venöz dilatasyon
- ❖ Kan akımında artış



# Stellat ganglion bloğu



Lateral



Kontrast madde yayılımı

AP

# **Stellat ganglion bloğu**

## **Kesin kontrendikasyonlar**

- Antikoagulan kullanımı
- Karşı tarafta pnömotoraks veya pnömektomi
- Yeni geçirilmiş myokard infarktüs

## **Rölatif kontrendikasyonlar**

- Glokom
- Atrioventriküler blok

# **Stellat ganglion bloğu**

## **❖ Yan etkiler**

- Horner sendromu
- Rekurren laringeal sinir bloğu
- Frenik sinir bloğu
- Brakiyal pleksus bloğu

## **❖ Komplikasyonlar**

- İntraspinal enjeksiyon
- İnvasküler enjeksiyon
  - Vertebral arter!
- Pnömotoraks

# Torakal sempatik blok

- ❖ Servikalde sempatik zincir somatik köklerden longus colli ve anterior skalen kas ayırmakta
- ❖ Torakalde sempatik ve somatik kökler çok yakın bu iki anatomik yapıyı ayıran kas yok
- ❖ Lumbar bölgede psoas major kası sempatik zinciri somatik köklerden ayırır
- ❖ Torakal zincir plevraya çok yakın

# Torakal sempatik blok

## Endikasyonlar

- ❖ Hiperhidroz ( $T_{1-5}$ )
- ❖ Angina pektoris ( $T_{1-5}$ )
- ❖ Özafagus kanseri ( $T_{2-8}$ )
- ❖ Posttorakotomi ağrısı
- ❖ Mastektomi sonrası meme fantom ağrısı
- ❖ Postherpetik nevralji

# Torakal sempatik blok

- ❖ Teknik

- Konvansiyonel veya puls RF

- ❖ Komplikasyonlar

- Pnömotoraks
  - İntratekal enjeksiyon
  - Somatik sinirlerin bloke olması

# **Splanknik ve Çöliak Blok**

## **Endikasyonlar**

- ❖ Abdominal organların malignitelerinden kaynaklanan ağrılar
- ❖ Akut veya kronik pankreatit ağrısı

# **Splanknik ve Çöliak Blok**

## **Kesin Kontrendikasyonlar**


- ❖ Lokal enfeksiyon
- ❖ Koagulopati

## **Rölatif Kontrendikasyonlar**


- ❖ Anatomik değişiklikler
- ❖ Abdominal aort anevrizması
- ❖ Solunum yetmezliği

# Splanknik sinir bloğu

Hedef T 11



# Splanknik sinir bloğu



## Paramedian yaklaşım

- $15^{\circ}$  oblik
- Orta hattan 6 cm lateralinden



# **Splanknik sinir bloğu için ilaçlar ve yöntemler**

## **❖ Lokal anestetik blok (kateter)**

- 10-15 ml %1 lidokain / %0.25 bupivakain

## **❖ Nörolitik blok**



- 10-15 ml absolu alkol / %6-10 fenol

# Çöliak pleksus bloğu


## Teknik

- ❖ Transdiskal yaklaşım
- ❖ Transaortik yaklaşım
- ❖ Anterior yaklaşım
- ❖ Transkrural yaklaşım (unilateral / bilateral )



# Anterior çöliyak gangliyon



# Posterior çöliyak gangliyon



# Çölyak plexus bloğu (Transdiskal yaklaşım)




B

C



E



# **Çölyak pleksus bloğu için ilaçlar ve yöntemler**

## **❖ Lokal anestetik blok (kateter)**

- 40ml %1 lidokain / %0.25 bupivakain

## **❖ Nörolitik blok**


- 40 – 50 ml alkol % 50- %97

# **Splanknik ve Çölyak sinir bloğu**


## **Komplikasyonlar**

- Hipotansiyon
- Diare
- Pnömotoraks
- Parapleji
- Torasik sinir kökünde parestezi
- Intravasküler enjeksiyon
- Subaraknoid veya epidural enjeksiyon
- Şilotoraks
- Vasküler tromboz veya embolizm
- İntradiskal enjeksiyon
- Retrotorasik hematom
- İşlem esnasında yada sonrasında ağrı

# LOMBER SEMPATİK BLOK



## Sempatik zincir




# Lomber sempatik blok

## Endikasyonlar

- ❖ İskemik vasküler hastalıklar
- ❖ Renal kolik
- ❖ CRPS Tip I ve Tip II
- ❖ Ürogenital ağrı
- ❖ Postamputasyon güdüklük ağrısı
- ❖ Fantom ağrı
- ❖ Hiperhidrozis
- ❖ Herpes zoster
- ❖ Akrosiyanozis

# Lomber sempatik blok


## Teknik



**Paramedian yaklaşım**  
**Lateral yaklaşım**

: Orta hattan 5-9cm  
: Orta hattan 10-14cm

# **LOMBER SEMPATİK BLOK**



# **LOMBER SEMPATİK BLOK**

## **Lokal anestetik blok**

### **❖ Çift iğne**

- L<sub>2</sub> ve L<sub>4</sub> (20 ml)

### **❖ Tek iğne**

- L<sub>3</sub> (10-20 ml)

## **Nörolitik blok (Fenol; % 6 - 10)**

### **❖ Tek iğne**

- 15 ml

### **❖ Üç iğne**

- 2 ml/segment

**RF**

# **LOMBER SEMPATİK BLOK**



## **Komplikasyonlar**

- ❖ Intravasküler enjeksiyon
- ❖ Subaraknoid enjeksiyon
- ❖ Intrapsoas enjeksiyon
- ❖ Nöralji
- ❖ Kas spazmı
- ❖ Retrograd ejakülasyon
- ❖ Girişim sonrası rahatsızlık

# Superior hipogastrik plexus

- Psoas kasının önünde
- İliak damarlarının arkasında

- L<sub>5</sub> vertebranın ücste iki alt kısmında - S<sub>1</sub> vertebranın ücste bir üst kısmında



# **Superior hipogastrik plexus**

## **Endikasyonlar**


### **> Malign kaynaklı**

- Pelvik organlar
  - \* Uterus Serviks
  - \* Rektum Prostat
- Radyoterapi hasarı

### **> Non-Malign kaynaklı**

- Pelvik inflamatuar hastalıklar
- Endometriyozis ve uterin ağrı
- Interstisyal sistit
- Irritabl kolon sendromu
- Belirlenen bir patoloji olmaksızın kr. pelvik ağrı

# **Superior hipogastrik pleksus**







**AP**

**Kontrast madde yayılımı**

**Lateral**

# **Superior hipogastrik blok**

Transdiskal yaklaşım



# **Superior hipogastrik blokta kullanılan ilaçlar ve yöntemler**

## **Lokal anestezik blok**

➤ 6-8ml %0.25 bupivakain

## **Nöroliz**

➤ 10ml %6-10 fenol

# **Superior hipogastrik blok**


## **Komplikasyonlar**

- İV enjeksiyon
- Subaraknoid veya epidural enjeksiyon
- Postural hipotansiyon
- Hematom
- Diyare
- Üreter ponksiyon
- Intraperitoneal enjeksiyon
- Diskitis

# İmpar ganglion bloğu

(Walther ganglion, Sakrokokksigeal ganglion)

➤ Orta hatta, tek ganglion



➤ Fenol %6 ; 5-10ml



# **İmpar ganglion bloğu**






## **❖AnATOMİ**

- Sakrumla koxsisin birleşme düzeyinde yer alan sempatik zincirin sonlanma noktasıdır

## **❖EndİKASYONLARI**

- Serviks, mesane, rektum ve endometrium kaynaklı malignitelerde
- Perineal ağrı, tenezm hissi

# İmpar ganglion bloğu



# İmpar ganglion bloğu

Transligamentöz yaklaşım



# *İmpar ganglion blogu*

## Komplikasyonlar

- ❖ Rektum ponksiyonu
- ❖ Rektal kaviteye nörolitik enjeksiyonu
- ❖ Sinir köküne nörolitik enjeksiyonu

# Sonuç olarak

## Stellat ganglion

- Üst ekstremitede periferik damar hastalığı
- Posttravmatik CRPS

## Torakal sempatik

- Posttorakotomi ağrısı
- Hiperhidrozis

## Lomber sempatik

- Alt ekstremitede periferik damar hastalığı
- Fantom ağrısı

Uygun hasta seçimi  
Deneyimli uygulayıcı  
Floroskopi kullanımı

**İlginize teşekkür ederim**



GATA Askeri Tıp Fakültesi

# **SEMPATİK SINİR BLOKLARI**

**DR. ERCAN KURT**



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

