

P-93**ARTERIOVENÖZ FİSTÜLDE İLERİ
DERECEDE VENÖZ STAZ NEDENİYLE
EKSTEMİTE KAYBI TEHDİTİ.**

DERELİ M, SIVACI R, ADALI F,
ALDEMİR M

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Giriş:

Kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz gereksinimi için açılan arteriyovenöz (AV) fistüllerde sıkça karşılaşılan venöz hipertansiyon bazen ekstremiteleri tehdit edebilmektedir. Hemodiyaliz amacıyla açılan arteriyovenöz (AV) fistüllerde kanama, tromboz, ekstremitte iskemisi, enfeksiyon, ödem, venöz hipertansiyon ve venöz anevrizma gibi komplikasyonlarla sıkça karşılaşılmaktadır

Olgu:

Kliniğimize A-V fistül operasyonu sonrasında gelişen venöz hipertansiyona ikincil gelişen ileri derecede sol üst ekstremitte

staz ülseri olgusu ve cerrahi onarımın sonuçları sunuldu.60 yaşında erkek hastanın 6 ay öncesinde hemodiyaliz amacıyla sol radiosefalik arteriovenöz end to side arteriovenöz fistül oluşturulmuştu. Hastanın bugüne kadar hemodiyaliz sırasında herhangi bir şikayeti yoktu. Son bir aydan buyana gelişen sol elde şişlik saptanması üzerine hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın arteriovenöz fistülü operasyonla ligate edilerek divize edildi. Hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. Hastanın 1 ay sonra yapılan kontrolünde sol ekstremitteki ödemin kaybolduğu gözlemlendi.

Tartışma ve Sonuç:

Hemodiyaliz gereksinimi nedeniyle yapılan A-V fistüllerin bu şekilde karşılaşılabilen komplikasyonları hastaların yaşam kalitesi ve süresini olumsuz etkileyebilmektedir. A-V fistül oluşturulması sırasında ven distalinin ligate edilmesi, ayrıca distale gidebilecek yan dalların bağlanması ön kol ve el ödemi, sonrasında venöz hipertansiyon oluşumunun önlenmesinde önemlidir.